

ТРИМЕБУТИН ВКЛЮЧЕН В КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

НОЗОЛОГИЯ	ВЗРОСЛЫЕ	ДЕТИ
Абдоминальная боль	✓	✓
СРК	✓	✓
СФД	✓	✓
ГЭРБ	✓	✓
Запоры	✓	✓
ЖКБ	✓	✓
ДЖВП/ Билиарные дисфункции	✓	✓
Гастрит и дуоденит	✓	

ЖАЛОБЫ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ БОЛЬНЫМИ С СРК

- Боль в животе неопределённая, постоянная
- Диспепсия
- Нарушение стула в виде запора, диареи или их чередования
- Ощущение вздутия живота
- Чувство неполного опорожнения кишечника

«СИМПТОМЫ ТРЕВОГИ» — ПОКАЗАНИЯ К УГЛУБЛЕННОМУ ОБСЛЕДОВАНИЮ

Жалобы и анамнез

- Уменьшение массы тела
- Начало заболевания в пожилом возрасте
- Ночная симптоматика
- Рак толстой кишки, целиакия, язвенный колит и болезнь Крона у родственников
- Постоянная боль в животе как единственный симптом поражения ЖКТ
- Прогрессирующее течение заболевания

Симптомы, выявленные при непосредственном обследовании

- Лихорадка
- Изменения со стороны внутренних органов (гепатомегалия, спленомегалия и др.)

Лабораторные показатели

- Снижение уровня гемоглобина
- Лейкоцитоз
- Повышение СОЭ
- Наличие скрытой крови в кале
- Изменения в биохимическом анализе крови
- Стеаторея и полифекалия

НЕОБУТИН®

СПАЗМОЛИТИК
С ПРОКИНЕТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ



работает только в ЖКТ*
и на всем его протяжении



1. ВТ. Ивашкин, ЮА. Шельгин, ЕК. Баранская, ЕА. Белоусова, АГ. Бениашвили и соавторы. Клинические рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации и Ассоциации колопроктологов России по диагностике и лечению синдрома раздраженного кишечника
2. Бельмер С.В., Вольнец Г.В., Горелов А.В., Гурова М.М., Звягин А.А., Корниенко Е.А., Новикова В.П., Печуров Д.В., Приворотский В.Ф., Тяжева А.А., Файзуллина Р.А., Хавкин А.И., Эрдес С.И. Функциональные расстройства органов пищеварения у детей. Рекомендации Общества детских гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов

1. ВТ. Ивашкин, ЮА. Шельгин, ЕК. Баранская, ЕА. Белоусова, АГ. Бениашвили и соавторы. Клинические рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации и Ассоциации колопроктологов России по диагностике и лечению синдрома раздраженного кишечника

*желудочно-кишечный тракт
Инструкция по медицинскому применению препарата Необутин РУ ЛП-003098
М-М-NEO-2022_08-721

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА
ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

Детская форма

для детей с 3-х лет

Ситуационный прием

для взрослых и детей с 12 лет

Курсовой прием

для взрослых и детей с 12 лет




✓ НЕ МАСКИРУЕТ «ОСТРЫЙ ЖИВОТ»¹

Симптоматическое лечение боли, спазмов и дискомфорта в области живота:

- При функциональном запоре
- При синдроме раздраженного кишечника
- При дисфункциях билиарного тракта


Дети в возрасте 3-5 лет



по 1/4 таб. (25 мг)

3 раза в сутки

Дети в возрасте 5-12 лет



по 1/2 таб. (50 мг)

3 раза в сутки



КУПИРУЕТ БОЛЬ И СПАЗМ ЧЕРЕЗ 20 МИНУТ ПОСЛЕ ПРИЕМА²

Симптоматическое лечение боли, спазмов, тяжести, дискомфорта в области живота и нарушения стула



х3 раза в день




Подходит
для разового
и курсового приема




ТАБЛЕТКИ С ПРОЛОНГИРОВАННЫМ ВЫСВОБОЖДЕНИЕМ¹

Для курсового лечения абдоминальной боли, связанной с функциональными заболеваниями пищеварительного тракта и желчных путей, в том числе при синдроме раздраженного кишечника

Для лечения СРК

 2 таблетки в день
Рекомендуемый курс – 28 дней

Для предупреждения рецидива СРК

 1 таблетка в день
Рекомендуемый курс – 12 недель

1. Инструкция по медицинскому применению препарата Необутин РУ ЛП-003098. Безрецептурный препарат

1. Инструкция по медицинскому применению препарата Необутин РУ ЛП-003098. Безрецептурный препарат
2. Трухан Д.И., Гришечкина И.А., Быховцев Н.А. Тримебутин в лечении синдрома раздраженного кишечника. Медицинский совет 2016; 19: 82-86.

1. Инструкция по медицинскому применению препарата Необутин Ретард РУ ЛП-003209. Безрецептурный препарат