


КОЛОНОСКОПИЯ СЕГОДНЯ —

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕДУПРЕДИТЬ РАЗВИТИЕ РАКА КИШЕЧНИКА В БУДУЩЕМ¹

Заболевания нижнего отдела ЖКТ, которые можно диагностировать в процессе колоноскопии



Что такое колоноскопия?

Колоноскопия — «золотой стандарт» диагностики². Процедура проводится путем введения эндоскопа — гибкого тонкого аппарата, оснащенного световодом и видеокамерой, через задний проход.

Нужно ли проходить колоноскопию, если ничего не беспокоит?

Профилактическое проведение колоноскопии помогает выявить рак в самом начале его развития, так как на ранних стадиях развития рак кишечника, как правило, не проявляется никакими симптомами¹.

Колоноскопия — это болезненная процедура?

Процедура связана с определенным дискомфортом и иногда болезненными ощущениями после введения колоноскопа. Понимая это, врач действует осторожно и аккуратно, стремясь свести возможные неприятные и болевые ощущения к минимуму. Для пациентов, желающих полностью исключить неприятные ощущения во время колоноскопии, предлагается вариант выполнения исследования в состоянии медикаментозного сна (под наркозом).

Сколько времени длится процедура колоноскопии?

Исследование занимает от 15 до 60 минут, это зависит от индивидуальных особенностей пациента. Больше время требуется, если проводятся манипуляции (взятие биопсии, удаление полипа).

Применение общей анестезии увеличивает продолжительность процедуры в целом, при этом уменьшается время выполнения колоноскопии.

Подготовка к колоноскопии обязательна?

Да, подготовка к исследованию крайне важна. Качественная подготовка толстой кишки позволяет выполнить четкий и детальный осмотр всей толстой кишки и выявить даже небольшие по размеру образования, так же как и выполнить весь спектр необходимых манипуляций².

Плохая подготовка влечет за собой риск снижения эффективности диагностики и увеличения времени осмотра².

Какой препарат для очистки кишечника выбрать?

ЭЗИКЛЕН®

- ✓ Хорошо изученный профиль безопасности **для пожилых пациентов**, а также для пациентов различных групп риска³
- ✓ Удобный и комфортный приём:
 - Всего **1 литр раствора** препарата⁴
 - **Мерный стакан** в упаковке⁴
 - Возможна **утренняя подготовка** в день исследования, если оно назначено на вторую половину дня⁴



или

ФОРТРАНС®

- ✓ Объем раствора препарата (4 литра) оптимально переносится в режиме дробного применения за 2 дня⁷
- ✓ Препарат, который сегодня назначает каждый второй специалист в России⁸



* По данным отчёта независимого аналитического агентства Alpharm (Альфарм)

Как улучшить подготовку к колоноскопии?


ФОРЛАКС®

- ✓ Подготовка кишечника у пациентов с запором (вместе с лаважным препаратом): начало приёма - за 5 дней до начала приема препарата для очистки¹¹
- ✓ Удобная форма выпуска – саше с оптимальной дозой препарата
- ✓ Эффект выражен в течение 24–48 часов после приёма¹⁰



МЕТЕОСПАЗМИЛ®

- ✓ **Комбинация 2 в 1:** спазмолитик алверин + пеногаситель симетикон 300 мг¹²
- ✓ Улучшает переносимость подготовки и процедуры колоноскопии за счет уменьшения вздутия живота и других симптомов реактивного дискомфорта¹³
- ✓ **Удобный прием:** 1 капсула – 2-3 раза в день накануне исследования и 1 капсула утром в день исследования¹²



Не является рекламой. Предназначено для использования врачами.

Что важно в процессе подготовки к исследованию?



Следовать рекомендациям врача и инструкции по применению препарата для очистки кишечника



Строго соблюдать специальную диету и режим питания и приёма жидкостей в зависимости от даты и времени исследования



При подготовке дома рассчитать соответствующий временной интервал для поездки в клинику



НЕЛЬЗЯ уменьшать объем раствора и дополнительной разрешенной жидкости, если её приём обязателен

Что такое колоректальный рак и почему важна диагностика?
Как правильно подготовиться к колоноскопии с помощью препаратов Майоли Фарма?
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ для пациентов по подготовке к колоноскопии (круглосуточно, без выходных)
Позвоните: 8 800 234 03 99 (бесплатно).

Источники информации: 1. Практическое руководство Всемирного гастроэнтерологического общества (ВГО) и Международного союза по профилактике рака пищеварительной системы: Скрининг колоректального рака (WGO Guidelines), 2008. 2. Завьялов Д.В., Кашин С.В. Пропущенные неоплазии толстой кишки. Колоректальная. 2015. № 1. С. 32-37. 3. Федоров Е.Д., Веселов В.В., Кашин С.В. и др. Оценка подготовки кишечника малообъемным препаратом на основе сульфатов в сравнении с макроголом: многоцентровое рандомизированное сравнительное клиническое исследование 3-й фазы. Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. 2019;29(2):60-75. 4. ЛВ Эзиклен®, концентрат для приготовления раствора для приема внутрь от 12.02.2024. 5. Д.В. Завьялов, С.В. Кашин. Современный опыт применения трисульфата при подготовке к колоноскопии с позиции клинической безопасности. Журнал «Колоректальная», 2020, №4, с.93-99. 6. Хассан Чезаре и др. Подготовка кишечника к колоноскопии: руководство Европейского общества эндоскопии желудочно-кишечного тракта (ESGE) - обновление 2019 // Endoscopy. – 2019. – Т. 51. – №. 08. – С. 775-794. 7. ЛВ Фортранс®, порошок для приготовления раствора для приема внутрь, от 08.05.2024. 8. Согласно данным базы данных AlphaRM «Розничный аудит аптекных продаж ЛС и БАД в РФ», доля продаж в натуральном выражении препарата «Фортранс» на розничном рынке в категории средств для очищения кишечника перед колоноскопией за период с января по октябрь 2024 года составляет 67,5%, что является максимальным значением (sell out, up) среди 5ти препаратов категории, доступных в аптеках России в октябре 2024г. 9. Семенова, Н.Н. Запоры у детей. Их диетическое лечение / Н.Н. Семенова, Т.Э. Боровик // Медицинский совет. –2008. –№3-4. – С. 27-32. 10. ИМП Форлак®, порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 10 г от 27.05.2024. 11. Клинические рекомендации «Подготовка пациентов к эндоскопическому исследованию толстой кишки», Российское эндоскопическое общество, издание №3, Москва, 2017. 12. ЛВ Метеоспазмил®, капсулы, от 25.09.2024. 13. Кашин С.В., Завьялов Д.В., Сиднева А.В. Влияние Метеоспазмил на эффективность и переносимость подготовки к колоноскопии. Доказательная гастроэнтерология. 2023;12(2):34-44. <https://doi.org/10.17116/docgastro20231202134>.