

# Инструкция

Краткий листок-вкладыш лекарственного препарата Смекта®, 3 г, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (апельсиновый, ванильный, клубничный). Соответствует ЛВ от 18.03.2024 (последовательность 0002).

Краткий листок-вкладыш лекарственного препарата Смекта®, 3 г, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (апельсиновый, ванильный, клубничный). Препарат Смекта® содержит смектит диоктаэдрический. Показания к применению: лечение острой диареи у детей старше 2 лет (в дополнение к пероральной регидратации) и у взрослых; симптоматическое лечение хронической функциональной диареи у взрослых; симптоматическое лечение боли, связанной с функциональными заболеваниями кишечника у взрослых. Способ действия: смектит диоктаэдрический поглощает бактерии, вирусы и различные токсины, обволакивает стенки кишечника, стабилизирует собственную защитную кишечную слизь и оказывает защищающее действие от раздражителей. Не применяйте, если у Вас: аллергия на смектит диоктаэдрический или любые другие вспомогательные вещества. Беременность и грудное вскармливание: Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Рекомендуемая доза: Для лечения острой диареи рекомендуемая доза для взрослых составляет – 3 пакетика в сутки в течение 7 дней. Суточная доза может быть удвоена в начале лечения. Для применения при других показаниях рекомендуемая доза для взрослых составляет – в среднем, 3 пакетика в сутки. Для лечения острой диареи у детей старше 2 лет рекомендуемая доза составляет – 2 пакетика в сутки в течение 7 дней. Суточная доза может быть удвоена в начале лечения. Беременность, грудное вскармливание, фертильность: Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Применение смектита диоктаэдрического не рекомендуется во время беременности и грудного вскармливания, в связи с ограниченными

данными. Возможные нежелательные реакции: частота неизвестна – гиперчувствительность, ангионевротический отек, зуд; часто – запор. Хранение: хранить при температуре не выше 30 °С. Держатель регистрационного удостоверения: ИПСЕН КОНСЬЮМЕР ХЕЛСКЕА, Франция. Представитель держателя регистрационного удостоверения на территории Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Армении: ООО «ИПСЕН КОНСЬЮМЕР ХЕЛСКЕА», 109147, г. Москва, ул. Таганская, д. 17-23. Тел./факс: +7 (495) 796-87-68; тел.: +7 (916) 764-36-58. Полная информация содержится в листке-вкладыше лекарственного препарата Смекта®

Краткий листок-вкладыш лекарственного препарата Смекта®, 3 г, паста для приема внутрь. Соответствует ЛВ от 17.04.2024

(последовательность 0002). SCA-RU-000520 Краткий листок-вкладыш лекарственного препарата Смекта®, 3 г, паста для приема внутрь.

Препарат Смекта® содержит смектит диоктаэдрический. Показания к применению: лечение острой диареи у детей старше 2 лет (в дополнение к пероральной регидратации) и у взрослых;

симптоматическое лечение хронической функциональной диареи у взрослых; симптоматическое лечение боли, связанной с

функциональными заболеваниями кишечника у взрослых. Способ действия: смектит диоктаэдрический поглощает бактерии, вирусы и различные токсины, обволакивает стенки кишечника, стабилизирует собственную защитную кишечную слизь и оказывает защищающее действие от раздражителей. Не применяйте, если у Вас: аллергия на смектит диоктаэдрический или любые другие вспомогательные вещества. Рекомендуемая доза: для лечения острой диареи

рекомендуемая доза для взрослых составляет – 3 пакетика в сутки в течение 7 дней. Суточная доза может быть удвоена в начале лечения.

Для применения при других показаниях рекомендуемая доза для взрослых составляет – в среднем, 3 пакетика в сутки. Для лечения острой диареи у детей старше 2 лет рекомендуемая доза составляет –

2 пакетика в сутки в течение 7 дней. Суточная доза может быть удвоена в начале лечения. Беременность, грудное вскармливание, фертильность: Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Применение смектита диоктаэдрического не

рекомендуется во время беременности и грудного вскармливания, в связи с ограниченными данными. Возможные нежелательные реакции: частота неизвестна – гиперчувствительность, ангионевротический отек, зуд; часто – запор. Хранение: хранить при температуре не выше 25°C. Держатель регистрационного удостоверения: ИПСЕН КОНСЬЮМЕР ХЕЛСКЕА САС, Франция. Представитель держателя регистрационного удостоверения на территории Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Армении: ООО «ИПСЕН КОНСЬЮМЕР ХЕЛСКЕА», 109147, г. Москва, ул. Таганская, д. 17-23. Тел./факс: +7 (495) 796-87-68; тел.: +7 (916) 764-36- 58. Полная информация содержится в листке-вкладыше лекарственного препарата Смекта®