



## Таблетки подъязычные 25 мг №10, №20

Подъязычно по 1 таблетке до 4 раз/сутки  
или по 2 таблетки 2 раза/сутки



## Суппозитории ректальные 100 мг №10

Предварительно рекомендуется освободить кишечник





## Порошок для приготовления раствора 100 мг №5

Внутримышечно. Препарат разводят в 2 мл воды  
для инъекций или 0,9% растворе натрия хлорида.  
Раствор, полученный при разведении, не подлежит хранению

ФОРМЫ ВЫПУСКА	ТАБЛЕТКИ 25 МГ №10, №20	ИНЬЕКЦИИ 100 МГ №5 ИЛИ СУППОЗИТОРИИ 100 МГ №10 + ТАБЛЕТКИ 25 МГ №20	ИНЬЕКЦИИ 100 МГ №5 ИЛИ СУППОЗИТОРИИ 100 МГ №10
СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТА	<b>Нетяжелая форма</b> проявления инфекции, пациенты, у которых нет возможности делать инъекции	Тяжелое, но у пациента нет возможности длительно делать инъекции	<b>Тяжелое:</b> частые рецидивы, выраженное изменение клинических анализов, повышение температуры
Острые респираторные инфекции, грипп, бронхит, пневмония, тонзиллит, отит, аденоидит	1 таблетка 4 раза в день, Курс 5 дней, 1 упаковка №20	100 мг (1 супп. или 1 инъекция) ежедневно 5 дней, продолжить по 1 таблетке 4 раза/день через день курсом до 15 дней. Курс 1 упаковка инъекций или суппозиториев и 1 упаковка таблеток.	100 мг (1 супп. или 1 инъекция) 1 раз/день 5 дней. Курс 1 упаковка инъекций или 1 упаковка суппозиториев.
При хроническом и частом рецидивирующем течении	продолжить 1 таблетка 4 раза/день через день курсом до 15 дней. Курс 2 упаковки №20.		
Для профилактики	1 таблетка 2 раза/день. Курс 5 дней, 1 упаковка №10. В эпидемический сезон – курс 10 дней 1 упаковка №20		
Воспалительные заболевания слизистой оболочки полости рта и горла	1 таблетка 4 раза/день 5 дней, затем 1 таблетка 4 раза/день через 3 суток курсом до 3-х недель. Курс 3 упаковки №20.	100 мг (1 супп. или 1 инъекция) ежедневно 5 дней, затем по 1 таблетке 4 раза/день через 3 суток курсом до 3-х недель. Курс 1 упаковка инъекций или суппозиториев и 2 упаковки таблеток.	100 мг (1 супп. или 1 инъекция) ежедневно 5 дней, затем 100 мг через 72 часа. Курс 3 упаковки инъекций или 2 упаковки суппозиториев
Хронические рецидивирующие заболевания, вызванные вирусом герпеса	1 таблетка 4 раза/день 10 дней, затем 1 таблетка 4 раза/день через сутки в течение 10 дней. Курс 3 упаковки №20.	100 мг (1 супп. или 1 инъекция) ежедневно 5 дней, затем по 1 таблетке 4 раза/день через сутки 15 дней. Курс 1 упаковка инъекций или суппозиториев и 2 упаковки таблеток.	100 мг (1 супп. или 1 инъекция) ежедневно 5 дней, затем 100 мг через день в течение 15 дней. Курс 4 упаковки инъекций или 2 упаковки суппозиториев
Для повышения физической работоспособности	1 таблетка 4 раза/день через день 10 дней, затем 1 таблетка 4 раза/день через 3 суток курсом до 3-х недель. Курс 4 упаковки №20.	100 мг (1 супп. или 1 инъекция) через день 5 дней, затем 1 таблетка 4 раза/день через 3 суток курсом до 3-х недель. Курс 1 упаковка инъекций или суппозиториев и 3 упаковки таблеток.	100 мг (1 супп. или 1 инъекция) через день 5 дней, затем 1 инъекция через 72 часа. Курс 4 упаковки инъекций или 2 упаковки суппозиториев

Длительность курса назначает врач в зависимости от тяжести патологического процесса

# ГАЛАВИТ®



Победитель фармацевтической премии  
**Russian Pharma Awards 2021** в номинации  
«Иммуномодулятор с противовоспалительным действием»



## АЛЬТЕРАЦИЯ

1



УМЕНЬШАЕТ ВЫРАЖЕННОСТЬ  
ИНТОКСИКАЦИИ

## ЭКССУДАЦИЯ

2



УМЕНЬШАЕТ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ  
ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИИ

## ПРОЛИФЕРАЦИЯ

3



РЕГЕНЕРАЦИЯ ТКАНЕЙ  
И БЕЗ ЗНАЧИМОГО ФИБРОЗА

ГАЛАВИТ УПРАВЛЯЕТ ПРОЦЕССОМ ВОСПАЛЕНИЯ, МОДУЛИРУЯ АДЕКВАТНУЮ  
РЕАКЦИЮ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ В ТРЕХ ОСНОВНЫХ ТОЧКАХ КОНТРОЛЯ